



FICHES TECHNIQUES VALORISÉES DES CULTURES MARAÎCHÈRES ET INDUSTRIELLES

La culture du POIS


ITCMI 2010

	الجبانة	
	POIS	
	PEA	
Nom botanique	<i>Pisum sativum</i>	
Famille:	<i>Papilionacées</i>	
Plante annuelle, originaire d'Asie Centrale (Afghanistan et l'Inde).		

I - PLANTE

- Nombre de graines au gramme : 3 à 10
- Germination : 1-2°C
- Température optimale : 18 °C.
- Nombre de jours pour la germination : 8 jours.
- Longévité moyenne de la graine : 3 à 5 ans.
- Cycle végétatif : 58 à 77 jours.

II - STADES PHENOLOGIQUES



- 09 : Levée.
- 10 : Une paire de feuilles écailleuses est visible
- 11 : Formation des feuilles et des vrilles.
- 15/35 : développement des feuilles.
- 51 : Formation des boutons floraux.
- 61 : Début de la floraison.
- 79 : Formation des gousses.
- 89 : Maturation des gousses.

III - VARIETES LES PLUS CULTIVEES EN ALGERIE

Express à longue gousse, Petit Provence, Onward, Merveille de kelvedon.

IV- EXIGENCES

- Préfère les sols de type silico argileux bien pourvus en chaux, pour les primeurs terres légères.
- Température : aime le climat maritime, supporte bien le froid.
- Redoute la sécheresse, exigeant en lumière (plante des jours longs 14 h).
- pH : 6,2 à 6,5.
- Salinité : 3 à 5 mmhos / cm⁻¹
- Hygrométrie : ≥ 70%.

V - ZONES DE PRODUCTION

Littoral, sublittoral et le sud (Biskra)

VI - MISE EN PLACE DE LA CULTURE

Labour 30 cm, disquage, planage et rayonnage.

6.1- SEMIS

- + **Primeur** : Mi août en irrigué.
Octobre en sec.
- + **Saison** : début novembre à fin janvier.



- + **Dose de semis** : 80 à 120 kg / ha
- + **Profondeur de semis** : 2 cm en sols lourds et à 4 cm en sols légers.
- + **Distances de plantation** : Inter lignes : 0,20 à 0,50 m.
Inter plants : 0,03 à 0,05 m.


6.2- ENTRETIEN DE LA CULTURE

Binage, buttage, désherbage

6.3 - FERTILISATION

Le pois a un cycle végétatif court exige une fumure rapidement assimilable.

- + **Fumure organique** : 20 t / ha (Épandage 3 mois avant plantation.)
- + **Fumure minérale** : 30 unités de N / ha
90 unités de P / ha
120 unités de K / ha
(de préférence lors du roulage avant semis)



6.4 - IRRIGATION

Besoins estimés.

Primeur : 2000 à 3000 m³ / ha

Saison : ≈ 1500 m³ / ha (irrigation d'appoint)


VII - PROTECTION SANITAIRE



← **Thrips du pois**
Fenvalerate ec



↑ **Anthraxnose du pois**
zirame wg



← **Mildiou : tache sur feuille**
(a) face inférieure.
(b) face supérieure.

Mildiou →
Mancozebwp
Soufre + cyproconazole



Botrytis : Dichlofluanide wp, Manèbe wp

Oïdium : Triadimenol ec, soufre 80%wg

Puceron du pois : Methomyl 25 % Lambda – Cyalothrine wg

VIII - RECOLTE

Elle se fait tous les 3 à 5 jours.

Manuelle, mécanique (type industriel)

Rendements : 5 à 8 t / ha

FTV : LA CULTURE DU POIS DE PLEIN CHAMP (1 HA)
RDT : 30 QX/HA

Opérations	Main d'œuvre			Matériel			Approvisionnement			Total DA
	Nbre J	Coût unitaire	Montant DA	Nbre H	Coût unitaire	Montant DA	quantité	Coût unitaire	Montant DA	
I .Semence :										
-Semence	-	-	-	-	-	-	110 kg	80	8800	8800
S/T	-	-	-	-	-	-	-	-	8800	8800
II. Travaux du sol :										
- Fertilisation	1	600	600	4	500	2000	6 qx	6000	36000	38600
- Labour	1	600	600	8	500	4000				4600
- Disquage + hersage	0,5	600	300	4	500	2000				2300
S/T	2,5	-	1500	16	-	8000	-	-	36000	45500
III. Plantation + Entretien:										
- Semis en ligne	0,5	600	300	4	500	2000	-	-		2300
- Désherbage	0,5	600	300	4	500	2000	10 kg	80	800	3100
- Binage (scarificateur)	0,5	600	300	4	500	2000	-	-		2300
- Buttage manuel	15	600	9000	-	-		-	-		9000
- Traitement+produits : fong+insect (mildiou-alternaria- pucerons...)	2	600	1200	8	500	4000		-	15000	
- Irrigations	4	600	2400	-	-		2500 m3	4	10000	12400
S/T	22,5	-	13500	20	-	10000	-	-	25800	49300
IV. Récolte + transport										
- Récolte manuelle	20	600	12000	-	-		-	-		12000
- Transport	1	600	600	8	500	4000	-	-		4600
S/T	21	-	12600	8	-	4000	-	-		16600
Total Général	46	-	27600	44	-	22000	-	-	70600	120200